

BOLLETTINO FITOSANITARIO OLIVO (N. 2): 03 agosto 2017

Monitoraggio Mosca dell'Olivo (*Bactrocera Oleae*) - Areale IRPINIA CENTRALE (AV)

Comune	Località	Altitudine (m)	Fase Fenologica	Cultivar	Catture/trappola/settimana	% infestazione attiva	Indicazioni
Lapio	C/da Fratte	487	indurimento del nocciolo	Ravece	1	0	Trattamenti prodotti rameici
Lapio	C/da Corteioanna	501	indurimento del nocciolo	Leccino	0-1	0	Trattamenti prodotti rameici
Lapio	C/da San Nicola	451	indurimento del nocciolo	Leccino/Ravece/Marinese	1-2	0	Trattamenti prodotti rameici
Lapio	C/da Campore	585	indurimento del nocciolo	Leccino	3-4	0	Trattamenti prodotti rameici
Paternopoli	C/da Serra	513	indurimento del nocciolo	Marinese/Ravece	1-2	0	Trattamenti prodotti rameici
Paternopoli	C/da Canalichio	456	indurimento del nocciolo	Ravece/Marinese/Leccino	2	0	Trattamenti prodotti rameici
Grottolella	C/da Toro	583	indurimento del nocciolo	Ruveia/Ravece/Grappolo	0	0	Trattamenti prodotti rameici
Capriglia	C/da Masseria	597	indurimento del nocciolo	Leccino/Pendolino	0-1	0	Trattamenti prodotti rameici
Salza Irpina	C/da Lenze	589	indurimento del nocciolo	Leccino/Frantoio	0-2	0	Trattamenti prodotti rameici
Parolise	C/da Campoforte	611	indurimento del nocciolo	Leccino/Frantoio/Grappolo	0-3	0	Trattamenti prodotti rameici

Fase fenologica: Indurimento del nocciolo

Monitoraggio:

- Lettura settimanale trappole al fine di monitorare l'andamento della popolazione di adulti;
- Determinazione settimanale della percentuale di infestazione attiva delle drupe (uova, larve di I e II età) prelevando un campione 100 drupe/ha di oliveto (10 olive scelte a caso dalla chioma di 10 piante rappresentative).

Controllo:

- Trattamenti con prodotti ad azione repellente sulle ovideposizioni: Rame; Caolino; Calce; Rame e Calce
- Trattamenti preventivi (adulti) con esche proteiche attivate con Spinosad (ammessi in regime di agricoltura biologica – max 8 trattamenti) o dimetoato (non ammessi in regime di agricoltura biologica) intervenendo alle primissime infestazioni;
- Trattamenti curativi (larvicidi) con dimetoato (non ammessi in regime di agricoltura biologica) al superamento della soglia del 10-15% di infestazione attiva delle drupe

