

BOLLETTINO FITOSANITARIO OLIVO (N. 1): 1 agosto 2018

Monitoraggio Mosca dell'Olivo (*Bactrocera oleae*) - Areale VALLE DEL MISCANO

Comune	Località	Altitudine (m)	Fase Fenologica	Media catture/trappola/settimana	% infestazione attiva	Indicazioni
CASALBORE	C/da San Michele	620	INDURIMENTO DEL NOCCIOLO	2	0	Trattamenti con prodotti ad azione antideponente
CASALBORE	Fontana Todino	550	INDURIMENTO DEL NOCCIOLO	0	0	Trattamenti con prodotti ad azione antideponente
CASALBORE	C/da Costa Cardilli	672	INDURIMENTO DEL NOCCIOLO	1	0	Trattamenti con prodotti ad azione antideponente
CASALBORE	C/da Costa Cardilli	600	INDURIMENTO DEL NOCCIOLO	1	0	Trattamenti con prodotti ad azione antideponente
CASALBORE	C/da San Ferro	632	INDURIMENTO DEL NOCCIOLO	2	2	Trattamenti con prodotti ad azione antideponente Trattamenti adulticidi
CASALBORE	C/da Lame	650	INDURIMENTO DEL NOCCIOLO	1	0	Trattamenti con prodotti ad azione antideponente
MONTECALVO IRPINO	C/da Frascino	500	INDURIMENTO DEL NOCCIOLO	3	0	Trattamenti con prodotti ad azione antideponente
MONTECALVO IRPINO	C/da Frascino	520	INDURIMENTO DEL NOCCIOLO	1	0	Trattamenti con prodotti ad azione antideponente
MONTECALVO IRPINO	C/da Olivara	500	INDURIMENTO DEL NOCCIOLO	0	0	Trattamenti con prodotti ad azione antideponente
MONTECALVO IRPINO	C/da Marinella	563	INDURIMENTO DEL NOCCIOLO	0	0	Trattamenti con prodotti ad azione antideponente

Fase fenologica: Indurimento del nocciolo

Monitoraggio:

- Lettura settimanale trappole al fine di monitorare l'andamento della popolazione di adulti;
- Determinazione settimanale della percentuale di infestazione attiva delle drupe (sommatoria di uova e larve) prelevando un campione 100 drupe/ha di oliveto (10 olive scelte a caso dalla chioma di 10 piante rappresentative).

Controllo:

- Trattamenti con prodotti ad azione repellente sulle ovideposizioni: Rame; Caolino; Calce e Rame; Zeolite.
- Trattamenti preventivi (adulticidi) con esche proteiche attivate con Spinosad (ammessi in regime di agricoltura biologica – max 8 trattamenti) o dimetoato (non ammessi in regime di agricoltura biologica) intervenendo alle primissime infestazioni;
- Trattamenti curativi (larvicidi) con dimetoato (non ammessi in regime di agricoltura biologica) al superamento della soglia del 10-15% di infestazione attiva delle drupe.

Note e suggerimenti: Si registrano condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo delle popolazioni del fitofago, sono presenti punture fertili soprattutto a carico delle drupe della cultivar ravece. Si consiglia di effettuare le operazioni di monitoraggio e controllo indicate.

