

BOLLETTINO FITOSANITARIO OLIVO (N. 3): 14 agosto 2018

Monitoraggio Mosca dell'Olivo (*Bactrocera oleae*) - Aree VALLE DEL MISCANO

| Comune | Località | Altitudine (m) | Fase Fenologica | Media catture/trappola/settimana | % infestazione attiva | % infestazione totale | Tendenza | Indicazioni |
|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--|
| CASALBORE | C/da San Michele | 620 | INGROSSAMENTO FRUTTI | 1 | 0 | 0 | = | Trattamenti con prodotti ad azione antideponente |
| CASALBORE | Fontana Todino | 550 | INGROSSAMENTO FRUTTI | 1 | 0 | 0 | = | Trattamenti con prodotti ad azione antideponente |
| CASALBORE | C/da Costa Cardilli | 672 | INGROSSAMENTO FRUTTI | 0 | 4 | 10 | = | Trattamenti con prodotti ad azione antideponente Trattamenti adulticidi |
| CASALBORE | C/da Costa Cardilli | 600 | INGROSSAMENTO FRUTTI | 0 | 0 | 0 | = | Trattamenti con prodotti ad azione antideponente |
| CASALBORE | C/da San Ferro | 632 | INGROSSAMENTO FRUTTI | 0 | 0 | 0 | = | Trattamenti con prodotti ad azione antideponente Trattamenti adulticidi |
| CASALBORE | C/da Lame | 650 | INGROSSAMENTO FRUTTI | 0 | 0 | 0 | = | Trattamenti con prodotti ad azione antideponente |
| MONTECALVO IRPINO | C/da Frascino | 500 | INGROSSAMENTO FRUTTI | 1 | 6 | 10 | - | Trattamenti con prodotti ad azione antideponente Trattamenti adulticidi |
| MONTECALVO IRPINO | C/da Frascino | 520 | INGROSSAMENTO FRUTTI | 3 | 5 | 8 | = | Trattamenti con prodotti ad azione antideponente Trattamenti adulticidi |
| MONTECALVO IRPINO | C/da Olivara | 500 | INGROSSAMENTO FRUTTI | 0 | 0 | 0 | = | Trattamenti con prodotti ad azione antideponente |
| MONTECALVO IRPINO | C/da Marinella | 563 | INGROSSAMENTO FRUTTI | 1 | 1 | 1 | = | Trattamenti con prodotti ad azione antideponente Trattamenti adulticidi |

Fase fenologica: ingrossamento dei frutti

Monitoraggio:

- Lettura settimanale trappole al fine di monitorare l'andamento della popolazione di adulti;
- Determinazione settimanale della percentuale di infestazione attiva delle drupe (sommatoria di uova e larve) prelevando un campione 100 drupe/ha di oliveto (10 olive scelte a caso dalla chioma di 10 piante rappresentative).

Controllo:

- Trattamenti con prodotti ad azione repellente sulle ovideposizioni: Rame; Caolino; Calce e Rame; Zeolite.
- Trattamenti preventivi (adulticidi) con esche proteiche attivate con Spinosad (ammessi in regime di agricoltura biologica – max 8 trattamenti) o dimetoato (non ammessi in regime di agricoltura biologica) intervenendo alle primissime infestazioni;
- Trattamenti curativi (larvicidi) con dimetoato (non ammessi in regime di agricoltura biologica) al superamento della soglia del 10-15% di infestazione attiva delle drupe.

Note e suggerimenti: Si registrano condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo delle popolazioni del fitofago, sono presenti punture fertili soprattutto a carico delle drupe della cultivar ravece. Si consiglia di effettuare le operazioni di monitoraggio e controllo indicate.

