

Monitoraggio Mosca dell'Olivo (*Bactrocera oleae*) - Aree VALLE UFITA

Comune	Località	Altitudine (m)	Fase Fenologica	Media catture/trappola/settimana	% infestazione attiva *	% infestazione dannosa **	% infestazione totale ***	Tendenza	Indicazioni
FLUMERI	C/da Acqua Chiusa	630	INGROSSAMENTO FRUTTI	3	5	10	15	+	Trattamenti con prodotti antideponente Trattamenti adulticidi
STURNO	C/da Caprara	600	INGROSSAMENTO FRUTTI	1	0	0	0	=	Trattamenti con prodotti antideponente
STURNO	C/da Montana	491	INGROSSAMENTO FRUTTI	6	3	24	27	-	Trattamenti con prodotti antideponente Trattamenti adulticidi
STURNO	C/da Piani	460	INGROSSAMENTO FRUTTI	1	0	0	0	=	Trattamenti con prodotti antideponente
ARIANO IRPINO	C/da Cerreto	566	INGROSSAMENTO FRUTTI	1	1	2	3	+	Trattamenti con prodotti antideponente Trattamenti adulticidi
ARIANO IRPINO	C/da San Liberatore	493	INGROSSAMENTO FRUTTI	3	0	0	0	=	Trattamenti con prodotti antideponente
ARIANO IRPINO	C/da San liberatore	454	INGROSSAMENTO FRUTTI	3	0	2	2	-	Trattamenti con prodotti antideponente
ARIANO IRPINO	C/da Torreamando	560	INGROSSAMENTO FRUTTI	3	0	4	4	+	Trattamenti con prodotti antideponente Trattamenti adulticidi
ARIANO IRPINO	Santa Maria a Tuoro	495	INGROSSAMENTO FRUTTI	4	2	12	14	-	Trattamenti con prodotti antideponente Trattamenti adulticidi
MONTECALVO IRPINO	C/da Cretazzi	590	INGROSSAMENTO FRUTTI	6	2	5	7	+	Trattamenti con prodotti antideponente Trattamenti adulticidi

*Uova e larve di I età; ** Larve di III età, pupe fori di sfarfallamento; *** tutte le forme di infestazione anche larve morte e parassitizzate.

Fase fenologica: Ingrossamento dei frutti

Monitoraggio:

- Lettura settimanale trappole al fine di monitorare l'andamento della popolazione di adulti;
- Determinazione settimanale della percentuale di infestazione attiva delle drupe (uova, larve di I e II età) prelevando un campione 100 drupe/ha di oliveto (10 olive scelte a caso dalla chioma di 10 piante rappresentative).

Controllo:

- Trattamenti con prodotti ad azione repellente sulle ovideposizioni: Rame; Caolino; Calce; Rame e Calce, Zeolite
- Trattamenti preventivi (adulticidi) con esche proteiche attivate con Spinosad (ammessi in regime di agricoltura biologica – max. 8 trattamenti) o dimetoato (non ammessi in regime di agricoltura biologica) intervenendo alle primissime infestazioni;
- Trattamenti curativi (larvicidi) con dimetoato (non ammessi in regime di agricoltura biologica) al superamento della soglia del 10-15% di infestazione attiva delle drupe.

Note e suggerimenti: Si registrano condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo delle popolazioni del fitofago, si consiglia di effettuare le operazioni di monitoraggio e controllo indicate

